5. Übungsblatt

Upload: 09.05.2025.

Deadline: 16.05.2025, 8:00 Uhr (im gruppeneigenen Briefkasten).

Aufgabe 5.1 (2 + 2 + 2)

Es sei $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$g(x) = c \cdot \begin{cases} \exp\left[\frac{1}{x^2-1}\right], & |x| < 1, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

mit

$$\frac{1}{c} = \int_{-1}^1 \exp\left[\frac{1}{x^2-1}\right] dx,$$

die Funktion aus Aufgabe 4.3. Sei nun $f \in C(\mathbb{R})$ eine stetige Funktion. Die Faltung von g mit f sei definiert als die Funktion $(g * f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$(g * f)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} g(x-y) \cdot f(y) dy$$

- Zeigen Sie, dass $g * f \in C^\infty(\mathbb{R})$.
- Sei $(g_n)_{n=1}^\infty \in (C_0^\infty(\mathbb{R}))^\mathbb{N}$ die durch $g_n(x) = n \cdot g(nx)$ definierte Funktionenfolge. Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ die Faltung $(g_n * f)(x) \rightarrow f(x)$ punktweise konvergiert, für $n \rightarrow \infty$.
- Seien nun $a < b \in \mathbb{R}$, $I = [a, b]$ und $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die charakteristische Funktion auf I , d.h.,

$$\chi(x) = \mathbf{1}_I(x) := \begin{cases} 1, & x \in I, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass es für alle $\varepsilon > 0$ eine Funktion $\chi_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$ gibt, mit $\chi_\varepsilon(x) = \chi(x) = 1$ für alle $x \in [a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ und $\chi_\varepsilon(x) = 0$ für $x \in \mathbb{R} \setminus [a - \varepsilon, b + \varepsilon]$.

Aufgabe 5.2 (2 + 4)

Berechnen Sie die Taylorpolynome zweiten Grades der folgenden Funktionen:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$ um den Entwicklungspunkt $\vec{x}_0 = (1, 2)$.
- $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, x_2, x_3) \mapsto e^{-x_3^2} \sin(x_1^2 + x_2^2)$ um den Entwicklungspunkt $\vec{x}_0 = (0, 0, 0)$.

Aufgabe 5.3 (3 + 3)

- Eine Teilmenge $F \subseteq \mathbb{R}^2$ heißt Figur, falls F die Vereinigung endlich vieler halboffener Quader ist, d.h.

$$F = Q_1 \cup Q_2 \cup \dots \cup Q_m$$

wobei

$$Q_i = [a_i, b_i) \times [c_i, d_i) \subseteq \mathbb{R}^2, \quad a_i \leq b_i, \quad c_i \leq d_i \in \mathbb{R}.$$

Die Menge aller Figuren sei $\mathcal{F}(\mathbb{R}^2)$. Zeigen Sie, dass $\mathcal{F}(\mathbb{R}^2)$ ein Mengerring ist.

- (b) Sei nun $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein beliebiger Mengenring über $\Omega \neq \emptyset$. Zeigen Sie, dass $(\mathcal{R}, \Delta, \cap)$ mit der symmetrischen Differenz

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

ein Ring im Sinne der Algebra ist wobei Addition durch Δ und Multiplikation durch $\cap$ definiert sind.

Aufgabe 5.4 (2 + 2 + 2)

Auf $\mathcal{F}(\mathbb{R}^2)$ sei $\mu : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ gegeben als

$$\mu(F) := \sum_{i=1}^m \mu(Q_i) = \sum_{i=1}^m (b_i - a_i) \cdot (d_i - c_i),$$

falls $Q_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} Q_m$ eine disjunkte Zerlegung von F ist, d.h., falls $F = Q_1 \cup \dots \cup Q_m$ und $Q_1, \dots, Q_m$ paarweise disjunkte halboffene Quader sind.

- (a) Zeigen Sie graphisch, dass jede Figur als endliche Vereinigung paarweise disjunkter halboffener Quader geschrieben werden kann und dass diese Zerlegung im Allgemeinen nicht eindeutig ist.
- (b) Zeigen Sie, dass μ wohldefiniert ist, d.h., falls $F = Q_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} Q_m = Q'_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} Q'_n$ auch durch eine zweite Zerlegung realisiert werden kann, dann gilt

$$\sum_{i=1}^n (b'_i - a'_i) \cdot (d'_i - c'_i) = \sum_{i=1}^m (b_i - a_i) \cdot (d_i - c_i).$$

- (c) Zeigen Sie, dass μ eine Inhaltsfunktion definiert, d.h., es gelten

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. $\mu(F) \geq 0$ für alle $F \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2)$,
3. Für paarweise disjunkte Figuren $F_1, \dots, F_n$, $F_i \cap F_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$, gilt $\mu(F_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} F_n) = \sum_{i=1}^n \mu(F_i)$.