

V. Reihen

V.1. Definitionen und Beispiele

Definition V.0.1. Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ eine Zahlenfolge. Dann heißt die Folge $(s_m)_{m=1}^{\infty} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, mit

$$s_m := \sum_{n=1}^m a_n, \quad (\text{V.1})$$

Reihe in \mathbb{K} und s_m nennt man die **m. Partialsumme** (dieser Reihe). Ist $(s_m)_{m=1}^{\infty}$ konvergent, so schreiben wir

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{m \rightarrow \infty} \{s_m\} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m a_n \right\}. \quad (\text{V.2})$$

Eine Umschreibung des Cauchy-Kriteriums, Satz IV.7, und des Monotoniekriteriums, Satz IV.3, von Folgen auf Reihen liefert

Lemma V.1 (Cauchy-Kriterium für Reihen). Sei $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^{\infty} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ eine Reihe in \mathbb{K} . Dann gilt

$$\left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^{\infty} \text{ ist konvergent} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m \geq n \geq n_0 : \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| \leq \varepsilon. \quad (\text{V.3})$$

Lemma V.2 (Monotoniekriterium für Reihen). Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty} \in (\mathbb{R}_0^+)^{\mathbb{N}}$ eine Folge nicht-negativer Zahlen. Dann gilt

$$\left\{ \left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^{\infty} \text{ ist konvergent in } \mathbb{R}_0^+ \right\} \Leftrightarrow \left\{ \left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^{\infty} \text{ ist nach oben beschränkt} \right\}. \quad (\text{V.4})$$

Bemerkungen und Beispiele.

- Wir beachten, dass man nicht nur Reihen als spezielle Folgen gewinnen kann, sondern dass man auch umgekehrt Folgen als spezielle Reihen auffassen kann, nämlich mit $a_n := s_n - s_{n-1}$.

- Aus der Anwendung des Cauchy-Kriteriums für Reihen, Lemma V.1, gewinnt man mit der Wahl $m = n \geq n_0$ sofort auch das **Nullfolgenkriterium**: Ist $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ eine konvergente Reihe, so ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ auch eine Nullfolge, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Meistens wendet man die Umkehrung dieser Aussage an: Wenn $a_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, nicht gilt, muss die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ divergieren.
- Sei $\lambda \in \mathbb{K}$ mit $0 \leq |\lambda| < 1$. Dann ist die **geometrische Reihe** $(\sum_{n=0}^m \lambda^n)_{m=0}^\infty$ konvergent in \mathbb{K} , und es gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n = \frac{1}{1 - \lambda}. \quad (\text{V.5})$$

Aus

$$(1 - \lambda) \left(\sum_{n=0}^m \lambda^n \right) = \sum_{n=0}^m \lambda^n - \sum_{n=0}^m \lambda^{n+1} = \sum_{n=0}^m \lambda^n - \sum_{\tilde{n}=1}^{m+1} \lambda^{\tilde{n}} = 1 - \lambda^{m+1} \quad (\text{V.6})$$

folgt nämlich

$$s_m := \sum_{n=0}^m \lambda^n = \frac{1 - \lambda^{m+1}}{1 - \lambda} \rightarrow \frac{1}{1 - \lambda}, \quad (\text{V.7})$$

für $m \rightarrow \infty$.

- Die **harmonische Reihe** $(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n})_{m=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ ist divergent, dies folgt aus Satz V.10 von Cauchy. In der Tat können wir später leicht mit Hilfe der Integralrechnung zeigen, dass $\sum_{n=1}^m \frac{1}{n} \approx \ln(m)$ unbeschränkt wächst, falls $m \rightarrow \infty$.
- Satz V.10 liefert aber auch die Konvergenz der Reihe $(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p})_{m=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$, für jedes $p > 1$.

V.2. Absolute Konvergenz

Definition V.2.1. Eine Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ in \mathbb{K} heißt **absolut konvergent**

$$:\Leftrightarrow \quad \text{Die Reihe } \left(\sum_{n=1}^m |a_n| \right)_{m=1}^\infty \text{ ist konvergent in } \mathbb{R}_0^+. \quad (\text{V.8})$$

Lemma V.3. *Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent.*

Beweis. Ist die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ absolut konvergent, so ist $(\sum_{n=1}^m |a_n|)_{m=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ konvergent. Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es also ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\forall m \geq n \geq n_0 : \sum_{k=n}^m |a_k| \leq \varepsilon. \quad (\text{V.9})$$

Mit der Dreiecksungleichung gilt dann auch

$$\forall m \geq n \geq n_0 : \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n}^m |a_k| \leq \varepsilon, \quad (\text{V.10})$$

also ist nach Lemma V.1 $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ konvergent in \mathbb{K} . □

Bemerkungen und Beispiele.

- Nicht jede konvergente Reihe ist auch absolut konvergent. Um dies zu sehen betrachten wir die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ mit $a_n := (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \in \mathbb{R}$.

Wir beobachten, dass für $m = 2k$ gilt

$$\begin{aligned} s_{2k} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} & (V.11) \\ &\leq 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} + \underbrace{\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2}}_{\geq 0} = s_{2k+2}. \end{aligned}$$

Also ist die Folge $(s_{2k})_{k=1}^\infty$ der Partialsummen mit gerader Zahl von Summanden monoton wachsend. Außerdem ist wegen $2\ell(2\ell - 1) \geq \ell^2$

$$s_{2k} = \sum_{\ell=1}^k \left(\frac{1}{2\ell - 1} - \frac{1}{2\ell} \right) = \sum_{\ell=1}^k \frac{1}{2\ell(2\ell - 1)} \leq \sum_{\ell=1}^k \frac{1}{\ell^2} \leq \text{const} < \infty \quad (V.12)$$

beschränkt, da die Reihe $(\sum_{\ell=1}^k \frac{1}{\ell^2})_{k=1}^\infty$ konvergent ist. Somit ist die Folge $(s_{2k})_{k=1}^\infty$ konvergent.

Sei nun $\varepsilon > 0$. Da $(s_{2k})_{k=1}^\infty$ konvergent ist, gibt es ein $k_0 \in \mathbb{N}_0$ so, dass

$$\forall \ell \geq k \geq k_0 : |s_{2\ell} - s_{2k}| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \quad (V.13)$$

Wir wählen $n_0 \in \mathbb{N}$ so groß, dass $n_0 \geq 2k_0 + 2$ und $\frac{1}{n_0} \leq \frac{\varepsilon}{3}$ ist. Sind nun $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m > n \geq n_0$, so gibt es eindeutige Zahlen $\ell, k \in \mathbb{N}, \ell \geq k \geq k_0$ und $\sigma, \tau \in \{0, 1\}$, sodass $m = 2\ell + \sigma$ und $n = 2k + \tau$ gelten. Damit erhalten wir aus (V.13)

$$\begin{aligned} |s_m - s_n| &= |s_{2\ell+\sigma} - s_{2k+\tau}| \leq |s_{2\ell+\sigma} - s_{2\ell}| + |s_{2\ell} - s_{2k}| + |s_{2k} - s_{2k+\tau}| \\ &\leq \frac{1}{2\ell} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{2k} \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon. \end{aligned} \quad (V.14)$$

Also ist $(s_n)_{n=1}^\infty$ eine Cauchy-Folge und daher auch konvergent.

- Andererseits ist $(\sum_{n=1}^m (-1)^{n+1} \frac{1}{n})_{m=1}^\infty$ nicht absolut konvergent, denn $(\sum_{n=1}^m |(-1)^{n+1} \frac{1}{n}|)_{m=1}^\infty = (\sum_{n=1}^m \frac{1}{n})_{m=1}^\infty$ ist divergent.

Eine fundamentale Eigenschaft absolut konvergenter Reihen ist die Tatsache, dass auch "Umordnungen" absolut konvergieren, und zwar alle gegen denselben Grenzwert.

Definition V.3.1. Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ Zahlenfolgen. Die Reihe $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ heißt **Umordnung der Reihe** $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty : \Leftrightarrow$

$$\exists \text{ Bijektion } \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} : b_n = a_{\sigma(n)}. \quad (V.15)$$

Satz V.4 (Großer Umordnungssatz). *Seien $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ eine Reihe in \mathbb{K} und $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ eine Umordnung von $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$. Dann gilt*

$$(i) \quad \left\{ \left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^\infty \text{ ist abs. konv.} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \left(\sum_{n=1}^m b_n \right) \text{ ist abs. konv.} \right\}, \quad (V.16)$$

$$(ii) \quad \left\{ \left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^\infty \text{ ist absolut konvergent} \right\} \Rightarrow \left\{ \sum_{n=1}^\infty a_n = \sum_{n=1}^\infty b_n \right\}. \quad (V.17)$$

Umgekehrt zeigt der nun folgende Satz, dass jede konvergente, aber nicht absolut konvergente Reihe in \mathbb{R} so umgeordnet werden kann, dass sie gegen jeden beliebigen vorgegebenen Grenzwert konvergiert.

Satz V.5. *Sei $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ eine Reihe in \mathbb{R} , die konvergent, aber nicht absolut konvergent ist, und seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha \leq \beta$, beliebig. Dann gibt es eine Umordnung $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ von $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$, so dass*

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} \{t_m\} = \alpha, \quad \limsup_{m \rightarrow \infty} \{t_m\} = \beta, \quad (V.18)$$

wobei $(t_m)_{m=1}^\infty$ die Folge in \mathbb{R} mit $t_m := \sum_{n=1}^m b_n$ ist.

Eine Anwendung von Satz V.4 ist das *Cauchy-Produkt*.

Dazu betrachten wir zwei Zahlenfolgen $(a_n)_{n=0}^\infty, (b_n)_{n=0}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ und die zugehörigen Reihen $(\sum_{n=0}^m a_n)_{m=1}^\infty, (\sum_{n=0}^m b_n)_{m=1}^\infty$ in \mathbb{K} , die wir als absolut konvergent annehmen. Wir bilden nun

$$c_0 := a_0 b_0, \quad (V.19)$$

$$c_1 := a_0 b_1 + a_1 b_0, \quad (V.20)$$

$$c_2 := a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \quad (V.21)$$

⋮

$$c_n := a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \quad (V.22)$$

für $n \in \mathbb{N}_0$, und betrachten die Reihe $(\sum_{n=0}^m c_n)_{m=1}^\infty$, das Cauchy-Produkt der Reihen $(\sum_{n=0}^m a_n)_{m=1}^\infty$ und $(\sum_{n=0}^m b_n)_{m=1}^\infty$.

Satz V.6 (Cauchy-Produkt). *Seien $(\sum_{n=0}^m a_n)_{m=1}^\infty, (\sum_{n=0}^m b_n)_{m=1}^\infty$ zwei absolut konvergente Reihen in \mathbb{K} und $c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, für $n \in \mathbb{N}_0$. Dann ist das **Cauchy-Produkt** $(\sum_{n=0}^m c_n)_{m=1}^\infty$ absolut konvergent in \mathbb{K} , und es gilt*

$$\sum_{n=0}^\infty c_n = \sum_{n=0}^\infty \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \left(\sum_{n=0}^\infty a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^\infty b_n \right). \quad (V.23)$$

V.3. Konvergenzkriterien

Für die Überprüfung, ob eine Reihe konvergent oder divergent ist, diskutieren wir drei Konvergenzkriterien: das Majorantenkriterium, das Wurzelkriterium und das Quotientenkriterium.

Satz V.7 (Majorantenkriterium).

- (i) Ist $(a_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ eine Zahlenfolge und ist $(b_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ eine Folge nichtnegativer Zahlen, sodass $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ (absolut) konvergent ist und $|a_n| \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, so ist auch $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ absolut konvergent in \mathbb{K} .
- (ii) Sind $(a_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ und $(b_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ zwei Folgen nichtnegativer Zahlen, sodass $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ divergent ist und $a_n \geq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, so ist auch $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ divergent.

Beweis.

(ii) Die Reihen über $(a_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ und $(b_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^\mathbb{N}$ sind jeweils genau dann konvergent, wenn $(s_m)_{m=1}^\infty$ bzw. $(t_m)_{m=1}^\infty$ nach oben beschränkt ist, wobei $s_m := \sum_{n=0}^m a_n$ und $t_m := \sum_{n=0}^m b_n$. Wegen der Divergenz von $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$ ist $(t_m)_{m=1}^\infty$ unbeschränkt somit auch $(s_m)_{m=1}^\infty$, da $s_m \geq t_m \geq 0$. Also ist auch $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ divergent.

Zu (i): Für $\varepsilon > 0$ gibt es, wegen der Konvergenz von $(\sum_{n=1}^m b_n)_{m=1}^\infty$, ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\forall m \geq n \geq n_0 : \sum_{k=n}^m |a_k| \leq \sum_{k=n}^m b_k \leq \varepsilon. \tag{V.24}$$

Also ist $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ absolut konvergent und somit auch konvergent, nach Lemma V.3. □

Satz V.8 (Wurzelkriterium). Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$ eine Zahlenfolge.

(i) Gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \} < 1, \tag{V.25}$$

so ist die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ absolut konvergent in \mathbb{K} .

(ii) Gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \} > 1, \tag{V.26}$$

so ist die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ divergent in \mathbb{K} .

Beweis.

Zu (i) Sei $\alpha := \limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \} < 1$. Für $\varepsilon := \frac{1-\alpha}{2} > 0$ gibt es dann nach Satz IV.4 (ii) ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\forall n \geq n_0 : \sqrt[n]{|a_n|} \leq \alpha + \varepsilon = \frac{1 + \alpha}{2} < 1. \tag{V.27}$$

Also ist, für alle $m \geq n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^m |a_k| &= \sum_{k=n}^m (\sqrt[k]{|a_k|})^k \leq \sum_{k=n}^m \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^k \leq \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^j \\ &= \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n \cdot \frac{1}{1-\frac{1+\alpha}{2}} = \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n \cdot \left(\frac{2}{1-\alpha}\right). \end{aligned} \quad (\text{V.28})$$

Wegen $\frac{1+\alpha}{2} < 1$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n \right\} = 0$, und somit ist nach dem Cauchy-Kriterium für Reihen $\left(\sum_{n=1}^m a_n\right)_{m=1}^{\infty}$ absolut konvergent.

(Gemäß (V.27) ist $|a_n| \leq \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n$ eine summierbare Majorante und die Behauptung hätte sich nach (V.27) auch direkt aus Satz V.7 (i) ergeben.)

Zu (ii) Seien $\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left\{ \sqrt[n]{|a_n|} \right\} > 1$ und $\varepsilon := \frac{\alpha-1}{2} > 0$. Dann gibt es eine Teilfolge $(a_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ mit

$$\forall j \in \mathbb{N} : \quad \sqrt[n_j]{|a_{n_j}|} > \alpha - \varepsilon = \frac{\alpha+1}{2} > 1. \quad (\text{V.29})$$

Dann sind

$$\forall j \in \mathbb{N} : \quad |a_{n_j}| \geq \left(\frac{\alpha+1}{2}\right)^{n_j} \geq 1. \quad (\text{V.30})$$

Um zu zeigen, dass $\left(\sum_{n=1}^m a_n\right)_{m=1}^{\infty}$ divergiert, beweisen wir, dass das Cauchy-Kriterium nicht erfüllt ist. Seien nämlich $\delta := \frac{1}{2}$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ irgend eine natürliche Zahl. Dann gibt es ein $j \in \mathbb{N}$, so dass $n_j \geq n_0$, und

$$\left| \sum_{k=n_j}^{n_j} a_{n_j} \right| = |a_{n_j}| \geq 1 > \delta. \quad (\text{V.31})$$

Für $m := n := n_j \geq n_0$ ergibt sich daraus ein Widerspruch zum Cauchy-Kriterium. \square

Bemerkungen und Beispiele.

- Für $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ gibt es keine allgemeine Aussage. Beispielsweise ist $\sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} \rightarrow 1$, mit $n \rightarrow \infty$, für alle $p > 0$, es ist aber $\left(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n^2}\right)_{m=1}^{\infty}$ (absolut) konvergent in \mathbb{R} und $\left(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n}\right)_{m=1}^{\infty}$ divergent in \mathbb{R} .

Satz V.9 (Quotientenkriterium). Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \setminus \{0\}$ eine Zahlenfolge.

(i) Für

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\} < 1 \quad (\text{V.32})$$

ist die Reihe $\left(\sum_{n=1}^m a_n\right)_{m=1}^{\infty}$ absolut konvergent.

(ii) Gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\forall n \geq n_0 : \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1, \quad (\text{V.33})$$

so ist die Reihe $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ divergent.

Bemerkungen und Beispiele.

- Ein Vergleich mit Bedingung (V.26) aus dem Wurzelkriterium für die Divergenz einer Reihe würde, übertragen auf das Quotientenkriterium, die Bedingung

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\} > 1 \quad (\text{V.34})$$

für die Divergenz einer Reihe suggerieren. Dies ist jedoch falsch,¹ wie das folgende Gegenbeispiel illustriert.

- Für

$$a_n := \begin{cases} 3^{-n}, & \text{falls } n \text{ ungerade ist,} \\ 2^{-n+1}, & \text{falls } n \text{ gerade ist,} \end{cases} \quad (\text{V.35})$$

ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ sicher konvergent, da $|a_n|$ die summierbare Majorante 2^{-n+1} besitzt, aber

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\} \geq \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{2k+1}|}{|a_{2k}|} \right\} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2^{-2k}}{3^{-2k}} \right\} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{3}{2}\right)^{2k} \right\} = \infty. \quad (\text{V.36})$$

V.4. Exponentialfunktion und trigonometrische Funktionen

Eine der wichtigsten Anwendungen der obigen Konvergenzkriterien ist die Darstellung bzw. Definition elementarer Funktionen durch Potenzreihen. Wir beginnen mit der Exponentialfunktion.

- Seien $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $a_n := z^n/n!$. Wir beobachten, dass

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|z|^{n+1} \cdot n!}{(n+1)! \cdot |z|^n} = \frac{|z|}{(n+1)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (\text{V.37})$$

Also ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|z|}{n+1} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|z|}{n+1} \right\} = 0 < 1. \quad (\text{V.38})$$

¹Ich danke Ch. Brauer und B. Komander für diesen Hinweis.

Mit Hilfe des Quotientenkriteriums, Satz V.9, sehen wir also, dass die Reihe $(\sum_{n=0}^m \frac{z^n}{n!})_{m=1}^{\infty}$ absolut konvergiert. Den Limes dieser Reihe nennen wir **Exponentialfunktion**,

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \exp[z] := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \quad (\text{V.39})$$

Dabei vereinbaren wir, dass $\exp[0] := 1$, d.h. hier ist Konvention $0^0 = 1$ sinnvoll und die Reihe für $\exp[0]$ besitzt nur einen nicht-verschwindenden Summanden.

- Analog seien $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $c_k := (-1)^k z^{2k} / (2k)!$ sowie $s_k := (-1)^k z^{2k+1} / (2k+1)!$. Dann sind

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \right\} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|z|^2}{(2k+2)(2k+1)} \right\} = 0 < 1, \quad (\text{V.40})$$

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|s_{k+1}|}{|s_k|} \right\} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|z|^2}{(2k+3)(2k+2)} \right\} = 0 < 1, \quad (\text{V.41})$$

und die zugehörigen Reihen, die **Kosinusreihe** $\cos[z]$ und die **Sinusreihe** $\sin[z]$,

$$\cos[z] := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin[z] := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad (\text{V.42})$$

sind absolut konvergent für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Für $z = 0$ ergibt sich $\cos[0] = 1$ und $\sin[0] = 0$.

- Weiterhin beobachten wir, dass wegen $i^{2k} = (-1)^k$

$$\begin{aligned} e^{iz} &:= \exp[iz] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n z^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} z^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} z^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos[z] + i \sin[z] \end{aligned} \quad (\text{V.43})$$

für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt.

- Insbesondere sind dann

$$\cos[-z] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (-z)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} = \cos[z], \quad (\text{V.44})$$

$$\sin[-z] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (-z)^{2k+1}}{(2k+1)!} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sin[z], \quad (\text{V.45})$$

woraus

$$\frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = \frac{1}{2}(\cos[z] + i \sin[z] + \cos[-z] + i \sin[-z]) = \cos[z], \quad (\text{V.46})$$

$$\frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{1}{2i}(\cos[z] + i \sin[z] - \cos[-z] - i \sin[-z]) = \sin[z] \quad (\text{V.47})$$

folgen.

- So erhalten wir für alle $z \in \mathbb{C}$ die hyperbolischen Funktionen aus den trigonometrischen durch

$$\cosh[z] := \cos[iz] = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) \quad \text{Kosinus Hyperbolicus,} \quad (\text{V.48})$$

$$\sinh[z] := \frac{1}{i} \sin[iz] = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) \quad \text{Sinus Hyperbolicus.} \quad (\text{V.49})$$

- Definieren wir außerdem die **Binominalkoeffizienten**

$$\forall m, n \in \mathbb{N}_0, m \geq n : \quad \binom{m}{n} := \frac{m!}{n!(m-n)!}, \quad (\text{V.50})$$

so gilt

$$\forall m \in \mathbb{N}_0, z, w \in \mathbb{C} : \quad (z+w)^m = \sum_{n=0}^m \binom{m}{n} z^n w^{m-n}. \quad (\text{V.51})$$

Setzen wir $a_n := \frac{z^n}{n!}$ und $b_n := \frac{w^n}{n!}$, dann erhalten wir also für das Cauchy-Produkt

$$\begin{aligned} c_m &:= \sum_{n=0}^m a_n b_{m-n} = \sum_{n=0}^m \frac{z^n}{n!} \frac{w^{m-n}}{(m-n)!} \\ &= \frac{1}{m!} \sum_{n=0}^m \underbrace{\frac{m!}{n!(m-n)!}}_{=\binom{m}{n}} z^n w^{m-n} = \frac{(z+w)^m}{m!}. \end{aligned} \quad (\text{V.52})$$

Also gilt das Additionstheorem für die Exponentialfunktion

$$\forall z, w \in \mathbb{C} : \quad \exp[z] \cdot \exp[w] = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m \right) = \left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m \right) = \exp[z+w]. \quad (\text{V.53})$$

- Schließlich erhalten wir die Additionstheoreme für die trigonometrischen Funktionen und komplexe Argumente $z, w \in \mathbb{C}$, etwa

$$\begin{aligned} &\cos[z] \cos[w] - \sin[z] \sin[w] \\ &= \frac{1}{4}(e^{iz} + e^{-iz})(e^{iw} + e^{-iw}) - \frac{1}{4i^2}(e^{iz} - e^{-iz})(e^{iw} - e^{-iw}) \\ &= \frac{1}{4}(e^{iz+iw} + e^{-iz+iw} + e^{iz-iw} + e^{-iz-iw} + e^{iz+iw} - e^{-iz+iw} - e^{iz-iw} + e^{-iz-iw}) \\ &= \frac{1}{2}(e^{i(z+w)} + e^{-i(z+w)}) = \cos[z+w], \end{aligned} \quad (\text{V.54})$$

und genauso $\sin[z+w] = \sin[z] \cos[w] + \cos[z] \sin[w]$.

V.5. Ergänzungen

V.5.1. Der Satz von Cauchy zur Konvergenz von Reihen nichtnegativer, monotoner Summanden

Satz V.10 (Cauchy). Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \in (\mathbb{R}_0^+)^{\mathbb{N}}$ eine monoton fallende Folge nichtnegativer Zahlen. Dann gilt

$$\left\{ \left(\sum_{n=1}^m a_n \right)_{m=1}^\infty \text{ ist konvergent in } \mathbb{R}_0^+ \right\} \Leftrightarrow \left\{ \left(\sum_{k=1}^\ell 2^k \cdot a_{2^k} \right)_{\ell=1}^\infty \text{ ist konvergent in } \mathbb{R}_0^+ \right\}. \quad (\text{V.55})$$

Beweis. Wir setzen

$$s_m := \sum_{n=1}^m a_n \quad \text{und} \quad t_\ell := \sum_{k=1}^\ell 2^k a_{2^k}. \quad (\text{V.56})$$

Konvergenz von $(\sum_{n=1}^m a_n)_{m=1}^\infty$ bzw. $(\sum_{k=1}^\ell 2^k a_{2^k})_{\ell=1}^\infty$ ist dann nach Lemma V.2 äquivalent zur Beschränktheit von $(s_m)_{m=1}^\infty$ und $(t_\ell)_{\ell=1}^\infty$ nach oben. Es genügt also zu zeigen, dass

$$\left[(s_m)_{m=1}^\infty \text{ ist nach oben beschränkt.} \right] \Leftrightarrow \left[(t_\ell)_{\ell=1}^\infty \text{ ist nach oben beschränkt.} \right] \quad (\text{V.57})$$

Für $m < 2^\ell$ ist

$$s_m \leq a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \dots + \underbrace{(a_{2^\ell} + a_{2^\ell+1} + \dots + a_{2^{\ell+1}-1})}_{2^\ell \text{ Summanden}}. \quad (\text{V.58})$$

Wegen $a_n \geq a_{n+1}$ sind

$$\begin{aligned} a_1 &\leq a_1, & a_2 + a_3 &\leq 2a_2, & a_4 + a_5 + a_6 + a_7 &\leq 4a_4, \\ & & \dots, a_{2^\ell} + a_{2^\ell+1} + \dots + a_{2^{\ell+1}-1} &\leq 2^\ell \cdot a_{2^\ell}. \end{aligned} \quad (\text{V.59})$$

Also gilt

$$s_m \leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \dots + 2^\ell a_{2^\ell} = t_\ell \quad (\text{V.60})$$

und somit

$$\sup \{s_m \mid m \in \mathbb{N}\} \leq \sup \{t_\ell \mid \ell \in \mathbb{N}\}. \quad (\text{V.61})$$

Für $m > 2^\ell$ ist jedoch

$$\begin{aligned} s_m &\geq a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6 + a_7 + a_8) \\ &\quad + \dots + \underbrace{(a_{2^{\ell-1}+1} + a_{2^{\ell-1}+2} + \dots + a_{2^\ell})}_{2^{\ell-1} \text{ Summanden}} \\ &\geq \frac{1}{2}a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \dots + 2^{\ell-1}a_{2^\ell} \\ &= \frac{1}{2} (a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \dots + 2^\ell a_{2^\ell}) = \frac{1}{2} t_\ell, \end{aligned} \quad (\text{V.62})$$

wiederum wegen $a_n \geq a_{n+1}$. Somit ist

$$\sup \{s_m \mid m \in \mathbb{N}\} \geq \frac{1}{2} \sup \{t_\ell \mid \ell \in \mathbb{N}\}. \quad (\text{V.63})$$

□

V.5.2. Beweis des Großen Umordnungssatzes V.4

Zu (i): Seien $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \sigma^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Bijektionen, so dass

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_{\sigma(n)} = b_n, \quad a_n = b_{\sigma^{-1}(n)}. \quad (\text{V.64})$$

Für $m \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$A(m) := \max \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(m)\}, \quad (\text{V.65})$$

$$B(m) := \max \{\sigma^{-1}(1), \sigma^{-1}(2), \dots, \sigma^{-1}(m)\}. \quad (\text{V.66})$$

Wir betrachten nun die monoton steigenden Folgen $(s_m)_{m=1}^\infty, (t_m)_{m=1}^\infty$ in \mathbb{R} , wobei

$$s_m := \sum_{n=1}^m |a_n|, \quad t_m := \sum_{n=1}^m |b_n|. \quad (\text{V.67})$$

Wir beobachten, dass, für jedes $m \in \mathbb{N}$,

$$t_m := \sum_{n=1}^m |a_{\sigma(n)}| \leq \sum_{n=1}^{A(m)} |a_n| = s_{A(m)}, \quad (\text{V.68})$$

$$s_m := \sum_{n=1}^m |b_{\sigma^{-1}(n)}| \leq \sum_{n=1}^{B(m)} |b_n| = t_{B(m)}. \quad (\text{V.69})$$

Somit ist

$$\sup_{m \in \mathbb{N}} \{t_m\} \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} \{s_{A(m)}\} \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} \{s_m\} \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} \{t_{B(m)}\} \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} \{t_m\}, \quad (\text{V.70})$$

also

$$\sup_{m \in \mathbb{N}} \{s_m\} = \sup_{m \in \mathbb{N}} \{t_m\}, \quad (\text{V.71})$$

und $(s_m)_{m=1}^\infty$ ist genau dann konvergent, wenn $(t_m)_{m=1}^\infty$ konvergent ist, nach Satz IV.3 (i).

Zu (ii): Seien $m \in \mathbb{N}$ und $B(m)$ wie in (V.66). Dann ist $B(m) \geq m$ und

$$\{\sigma^{-1}(1), \sigma^{-1}(2), \dots, \sigma^{-1}(m)\} \subseteq \{1, 2, \dots, B(m)\}, \quad (\text{V.72})$$

was

$$\begin{aligned} \{1, 2, \dots, m\} &= \{\sigma(\sigma^{-1}(1)), \sigma(\sigma^{-1}(2)), \dots, \sigma(\sigma^{-1}(m))\} \\ &\subseteq \{\sigma(n) \mid n = 1, 2, \dots, B(m)\} \subseteq \{1, 2, \dots, A(B(m))\} \end{aligned} \quad (\text{V.73})$$

impliziert. Also ist $Q_m := \{\sigma(n)\}_{n=1}^{B(m)} \supseteq \{1, \dots, m\}$

$$\sum_{n=1}^{B(m)} b_n - \sum_{n=1}^m a_n = \sum_{k \in Q_m} a_k - \sum_{k \in \{1, \dots, m\}} a_k = \sum_{k \in Q_m \setminus \{1, \dots, m\}} a_k, \quad (\text{V.74})$$

und wegen $Q_m \subseteq \{1, 2, \dots, A \circ B(m)\}$ ist dann

$$\left| \sum_{n=1}^{B(m)} b_n - \sum_{n=1}^m a_n \right| \leq \sum_{k \in Q_m \setminus \{1, \dots, m\}} |a_k| \leq \sum_{n=m+1}^{A \circ B(m)} |a_n| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n|. \quad (\text{V.75})$$

Ist nun $\varepsilon > 0$, und ist $m_0 \in \mathbb{N}$ so groß, dass

$$\forall m \geq m_0 : \sum_{n=m_0+1}^m |a_n|, \quad \sum_{n=m_0+1}^m |b_n| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \quad (\text{V.76})$$

dann sind, wegen $B(m) \geq m$,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{m_0} a_n \right|, \quad \left| \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{B(m_0)} b_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \quad (\text{V.77})$$

Also ist mit (V.77) und (V.75))

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| &\leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{B(m_0)} b_n \right| + \left| \sum_{n=1}^{B(m_0)} b_n - \sum_{n=1}^{m_0} a_n \right| + \left| \sum_{n=1}^{m_0} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \\ &\leq \frac{2\varepsilon}{3} + \sum_{n=m_0+1}^{\infty} |a_n| \leq \varepsilon. \end{aligned} \quad (\text{V.78})$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig klein gewählt werden kann, folgt $\left| \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| = 0$, also

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad (\text{V.79})$$

V.5.3. Beweis von Satz V.6 zum Cauchy-Produkt

Seien $a := \sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $b := \sum_{n=0}^{\infty} b_n$, $A := \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$, $B := \sum_{n=0}^{\infty} |b_n|$. Sei weiterhin $\varepsilon > 0$. Wegen der absoluten Konvergenz von $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)_{m=0}^{\infty}$ und $(\sum_{n=0}^{\infty} b_n)_{m=0}^{\infty}$ gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass, für alle $n \geq n_0$,

$$\left| a - \sum_{k=0}^n a_k \right| \leq \varepsilon, \quad \left| b - \sum_{k=0}^n b_k \right| \leq \varepsilon, \quad (\text{V.80})$$

$$\left| A - \sum_{k=0}^n |a_k| \right| \leq \frac{\varepsilon}{A+B}, \quad \left| B - \sum_{k=0}^n |b_k| \right| \leq \frac{\varepsilon}{A+B}. \quad (\text{V.81})$$

Wir beobachten nun, dass für $M \geq 2m$, $M, m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=2m}^M |c_n| = \sum_{n=2m}^M \sum_{k=0}^n |a_k| |b_{n-k}| \leq \sum_{\alpha=0}^m \sum_{\beta=m}^M |a_\alpha| |b_\beta| + \sum_{\alpha=m}^M \sum_{\beta=0}^m |a_\alpha| |b_\beta|. \quad (\text{V.82})$$

Also ist, für $M \geq 2m \geq m \geq n_0$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=2m}^M |c_n| &\leq \underbrace{\left(\sum_{\alpha=0}^m |a_\alpha| \right)}_{\leq A} \underbrace{\left(\sum_{\beta=m}^M |b_\beta| \right)}_{\leq \varepsilon/A+B} + \underbrace{\left(\sum_{\alpha=m}^M |a_\alpha| \right)}_{\leq \varepsilon/A+B} \underbrace{\left(\sum_{\beta=0}^m |b_\beta| \right)}_{\leq B} \\ &\leq (A+B) \cdot \left(\frac{\varepsilon}{A+B} \right) = \varepsilon. \end{aligned} \quad (\text{V.83})$$

Somit ist $(\sum_{n=0}^m c_n)_{m=0}^\infty$ absolut konvergent. Außerdem ist

$$\begin{aligned} \left| ab - \sum_{n=0}^{2m} c_n \right| &\leq \left| ab - \left(\sum_{\alpha=0}^m a_\alpha \right) \left(\sum_{\beta=0}^m b_\beta \right) \right| + \left| \left(\sum_{\alpha=0}^m a_\alpha \right) \left(\sum_{\beta=0}^m b_\beta \right) - \sum_{n=0}^{2m} c_n \right| \\ &\leq \left| a - \sum_{\alpha=0}^m a_\alpha \right| \cdot |b| + \left| \sum_{\alpha=0}^m a_\alpha \right| \cdot \left| b - \sum_{\beta=0}^m b_\beta \right| \\ &\quad + \left(\sum_{\alpha=0}^m |a_\alpha| \right) \left(\sum_{\beta=m}^{2m} |b_\beta| \right) + \left(\sum_{\alpha=m}^{2m} |a_\alpha| \right) \left(\sum_{\beta=0}^m |b_\beta| \right) \\ &\leq \varepsilon(|b| + A + A + B) \leq 2(A+B)\varepsilon, \end{aligned} \quad (\text{V.84})$$

also gilt auch (V.23).

V.5.4. Rückführung des Quotientenkriteriums auf das Wurzelkriterium

Beweis von Satz V.9 [Quotientenkriterium].

Zu (i) Sei $\beta := \limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\} \in \mathbb{R}_0^+$. Dann gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\forall n \geq n_0 : \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \beta + \varepsilon, \quad (\text{V.85})$$

nach Satz IV.4 (ii). Also ist

$$\forall n \geq n_0 : |a_n| \leq \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} \cdot \frac{|a_{n-1}|}{|a_{n-2}|} \cdots \frac{|a_{n_0+1}|}{|a_{n_0}|} \cdot |a_{n_0}| \leq (\beta + \varepsilon)^{n-n_0} |a_{n_0}|, \quad (\text{V.86})$$

und daher

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq (\beta + \varepsilon) \cdot \sqrt[n]{|a_{n_0}| \cdot (\beta + \varepsilon)^{-n_0}} \rightarrow \beta + \varepsilon, \quad \text{für } n \rightarrow \infty. \quad (\text{V.87})$$

Somit erhalten wir, dass

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \} \leq \beta + \varepsilon. \quad (\text{V.88})$$

Im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$ folgt damit, dass

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \} \leq \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right\}, \quad (\text{V.89})$$

und (i) folgt nun aus dem Wurzelkriterium.

Zu (ii) Sind umgekehrt $n_0 \in \mathbb{N}$ und

$$\forall n \geq n_0 : \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1, \quad (\text{V.90})$$

so ist

$$\forall n \geq n_0 : |a_n| \geq \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} \cdot \frac{|a_{n-1}|}{|a_{n-2}|} \cdots \frac{|a_{n_0+1}|}{|a_{n_0}|} \cdot |a_{n_0}| \geq |a_{n_0}| > 0. \quad (\text{V.91})$$

Also ist $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ keine Nullfolge, und das Nullfolgenkriterium ergibt die Divergenz der zugehörigen Reihe. \square